



FICHA TÉCNICA

CRONOS[®]

CRONOS
HERBICIDA AGRÍCOLA
GRÁNULOS DISPERSABLES (WG)
REGISTRO ICA No. 0418
A NOMBRE DE SODIAK S.A.

INGREDIENTES ACTIVOS:

Metsulfuron Metil

GRUPO QUÍMICO:

Sulfonilurea

**MECANISMO DE ACCIÓN:**

Metsulfuron Metil actúa interfiriendo la síntesis de los aminoácidos de cadena ramificada valina, leucina e isoleucina, inhibiendo la división celular en los meristemas y deteniendo el crecimiento.

MODO DE ACCIÓN:

Herbicida selectivo, sistémico de absorción radicular y foliar, rápida traslocación acopetral.

CULTIVO	MALEZAS	DOSIS g/Ha	P.C.	P.R.
ARROZ	Buche de Gallina <i>Heteranthera limosa</i> <i>Heteranthera raniformis</i>	15	1 día	1 día
	Clavito <i>Jussiaea linifolia</i>			
	Batatillas <i>Ipomoea sp</i>			
	Botón blanco <i>Eclipta alba</i>			
	Piñita <i>Murdania nudiflora</i>			
	Verdolaga <i>Portulaca oleracea</i>			
	Bledo <i>Amaranthus dubius</i>			
	Chilinchil <i>Cassia tora</i>			
	Lechosa <i>Euphorbia heterophylla</i>			
	Pega-pega <i>Desmodium tortuosum</i>			
	Botoncillo <i>Caperonia palustris</i>			
	Balsilla <i>Corchorus orinocensis</i>			
	Palo de agua <i>Ammania coccinea</i>			
	Dormidera <i>Mimosa spp</i>			
Suelda con suelda <i>Commelina difusa</i>				
Falsa caminadora <i>Ischaemum rugosum</i>				
POTREROS	Escoba <i>Sida acuta</i>	15	1 día	1 día
	Rabo de alacrán <i>Heliotropium indicum</i>			
	Lengua de vaca <i>Rumex conglomerata</i>			
	Hierba de pollo <i>Commelina difusa</i>			
	Pincelillo, Clavelillo <i>Emilia sonchifolia</i>			

CATEGORÍA TOXICOLÓGICA III
LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO