



VDX 75.7 GLIFOSATO SG
HERBICIDA AGRÍCOLA
GRÁNULOS SOLUBLES - SG
REGISTRO ICA No. PL0003002024
A NOMBRE DE SODIAK S.A.

FICHA TÉCNICA

VDX^{75.7}
SG
GLIFOSATO



INGREDIENTES ACTIVOS:

Glifosato 757 g/kg
Inertes c.s.p. 1 kg

MODO DE ACCIÓN:

GLIFOSATO VDX 75.7 es un herbicida no selectivo, de aplicación post-emergente y de acción sistémica, recomendado para el control de la mayoría de las malezas anuales y perennes tanto gramíneas como de hoja ancha y ciperáceas. El mecanismo de acción del glifosato es por medio del impedimento de la biosíntesis de aminoácidos aromáticos en las plantas (triptófano, fenilalanina y tirosina) mediante la inhibición de la enzima (EPSPS), con lo que se reduce la producción de proteína y el desarrollo de la misma.

Este herbicida penetra por las hojas y se mueve por las partes aérea y subterránea de las plantas causando la muerte total de las malezas entre siete y veinte días después del tratamiento.

RECOMENDACIONES DE USO:

CULTIVO	MALEZAS QUE CONTROLA	DOSIS	P.C.	L.M.R.	P.R.
Pastos	Bledo (<i>Amaranthus dubius</i>) Venadillo (<i>Conyza bonariensis</i>) Cortadera (<i>Cyperus rotundus</i>) Guardarocio (<i>Digitaria sanguinalis</i>) Batahilla (<i>Ipomoea purpurea</i>) Amor seco (<i>Bidens pilosa</i>) Botón de oro (<i>Sigesbeckia jorullensis</i>) Falso trébol (<i>Oxalis latifolia</i>) Cadillo (<i>Desmonium uncinatum</i>) Helecho (<i>Pteridium aquilinum</i>)	1.5 kg/ha	N.A.*	500** mg/Kg	0 horas

P.C: Período de carencia. Días que deben transcurrir entre la última aplicación y la cosecha.

*Tiempo para el reingreso del ganado a pastoreo: 21 días.

P.R: Período de reentrada. Intervalo de tiempo que debe transcurrir entre la aplicación y el reingreso de personas al área o cultivo tratado.

N.A.: No aplica-

L.M.R.: Límite máximo de residuos.**Fuente: CODEX

Nocivo en caso de Ingestión.
Nocivo en contacto con la piel.
Nocivo si se inhala.

Tóxico para organismos acuáticos.



ATENCIÓN





VDX 75.7 GLIFOSATO SG
HERBICIDA AGRÍCOLA
GRÁNULOS SOLUBLES - SG
REGISTRO ICA No. 3125
A NOMBRE DE SODIAK S.A.

INGREDIENTES ACTIVOS:

Glifosato 757 g/kg
Inertes c.s.p. 1 kg

FICHA TÉCNICA

VDX^{75.7}
SG
GLIFOSATO



FRECUENCIA Y EPOCA DE APLICACIÓN:

Se recomienda realizar las aplicaciones de GLIFOSATO VDX 75.7 SG en post-emergencia. Las malezas deben estar en etapa de crecimiento vigoroso y que no hayan alcanzado el estado de floración y/o fructificación. Este herbicida debe aplicarse con adecuadas condiciones de humedad del suelo.

EQUIPOS Y VOLUMEN DE MEZCLA:

Calibre bien los equipos y asegure un tamaño y distribución de gotas uniforme. Se recomienda aplicar con boquillas de abanico plano a una presión de 40 a 50 PSI.

Al aire libre, diluir la dosis del producto en la mitad del volumen de agua. Completar el volumen con agua agitando constantemente hasta obtener una mezcla homogénea.

COMPATIBILIDAD Y FITOTOXICIDAD:

GLIFOSATO VDX 75.7 SG se debe usar siguiendo las recomendaciones técnicas enunciadas en esta etiqueta. Por ser un herbicida no selectivo se recomienda no mezclarlo con otros herbicidas, no obstante cuando se hagan mezclas se recomienda hacer primero pequeñas pruebas de compatibilidad y eficacia. Mezclas en tanque con herbicidas residuales como ureas sustituidas y triazinas o con herbicidas como paraquat, phenoxy u otros herbicidas de tipo auxinas, pueden reducir la eficacia del glifosato.

Nocivo en caso de Ingestión.
Nocivo en contacto con la piel.
Nocivo si se inhala.

Tóxico para organismos acuáticos.



ATENCIÓN

